

# ستاركيم



المصنع الوحيد في مجاله  
الحاائز على شعارات  
الزيزو في الجودة والبيئة  
والصحة والسلامة  
المهنية (ASME, ATEX, ISO)

شركة ستاركيم لتصنيع الكيماويات  
مدينة ٦ أكتوبر المنطقة الصناعية  
ال السادسة قطعة ٣٥  
٢٣٥٣٩١٥١٥

# البطاطس وأهميتها كمحصول

نظراً لأهمية محصول البطاطس من الناحية الاقتصادية حيث أنه محصول تصديرى- محلى هام و أهميته من الناحية الغذائية حيث أنه يحتوى على طاقة عالية وكذلك كربوهيدرات وبروتين ودهون واملاح معدنية وفيتامينات ولذلك يقبل عليه المستهلك بنسبة عالية وحيث أن محصول البطاطس المصرى ذو أهمية كبيرة للمواطن المصرى والأوروبي لذلك تعتبر البطاطس المصرية من المحاصيل التصديرية الهامة.

يمكن زراعة نبات البطاطس في أنواع متباينة من التربة ولكن تعتبر التربة المفككة المسامية التي يتخللها الهواء بسهولة والجيدة الصرف أحسن أنواع التربة لانتاج محصول البطاطس.

متوسط إنتاج فدان بطاطس من الدرنات حوالي ٨ - ١٢ طن للفدان في العروة الخريفية والعروة المحيرة و ٦ - ٧ طن في العروة الربيعية.

**طريقة زراعة البطاطس المفضلة هي الترديم** وتعتبر هذه الطريقة هي الطريقة الشائعة والمفضولة لدى معظم المزارعين في مصر حيث يتم حرج الأرض من ٣ - ٤ مرات حرثاً ومتعمداً وتزحف بين كل حرثة والأخرى ثم يضاف السماد البلدى القديم وسماد السوبر فوسفات قبل الحرثة الأخيرة.

طريقة الزراعة الآلية تتم في المناطق الجديدة والأراضي المستصلحة بنواحي النوبارية والصالحية والشرقية والإسماعيلية وبعض المساحات الكبيرة في أراضي الوادي بالطرق الآلية وذلك تفادياً لنقص الأيدي العاملة المدربة وإرتفاع الأجور. وهناك طريقتان للزراعة الآلية هما: طريقة الزراعة النصف الآلية- طريقة الزراعة كاملة الآلية.

وهناك نوعين لأصناف البطاطس المستخدمة في مصر بـ بطاطس التصنيع : و هي مخصصة لأصابع البطاطس المجمدة والشيبسى وأنواعها : ليدي روزيتا - هيرمس - الفا .  
بطاطس مائدة و أنواعها : ديمونت - كارا - اسبونتا - نيقولا - دراجا .



# شوري



شورى



و الأميستو ممکن نحطه على البطاطس  
في المرحلة الأولى بأكثر من طريقة ..  
ركزوا معايا ... لكن اذا زرعت البطاطس  
من غير الأميستو لازم تخلى بالك انه  
مع أول ترديم على البطاطس عشان  
ترفع الخط و تخلى التقاوى مدفونة  
تحت الأرض بحوالى ٢٠-١٥ سم .



**المهم قبل ما تردم ممکن تحط المبید الأمیستو (لتر)  
مع كمية من المياه من ..-٤ لتر مياه و تساساه على الجور  
بتاعتك من فوق يبقى انت ضمنت مكافحة  
كل أمراض التربة و القشرة السوداء .**



لازم نتعلم اننا نراقب و نأخذ  
بالنا من الجو و الشبورة  
و نتوقع ان اللدودة حتنزل  
و الغطري بيتدى ينبت بالليل  
و الصبح بدرى و يعمل الاصابة .

**اوعوا تننسوا الاتلانت  
لتر للفدان .. و ترش مرتين  
الى ٣ مرات على البطاطس  
السليمة اللي مافيهاش ندوة  
.. يبقى كدة عملنا مقاومة  
للنباتات الاتلانت اللي هو فيه  
بوتاسيوم فوسفيت**



يا أميسنو يا أميسنو



انا عندي كل الحلول في ٣ مبيدات  
من احسن ما يكون و لكل الظروف بس لازم  
تسمعوا كلامي ... كلهم قالوا  
حاضر حتى الواد نخلة قعد على حيله ..



ممكن يا باشمهندس توصف  
لنا الندوة المتأخرة  
كونيسا.. قالها

**اسمعي يا خوحة الندوة عباره**  
عن مرض مش حشرة و الورق بيصاًب و الاعناق بـتاعته  
و حمان السيقان ... و مع نزول المطر في الشتاء  
الجراثيم تقع على الارض و تجع الاصابه على الدرنات  
الجديدة و المحصول يبقى سيء... بس انا عاوز اسان  
الدكتور نعمل ايه لمكافحة  
**الندوة المتاخرة؟**



# الخضراع



# SHOURA CHEMICALS



Shoura Group

Members

Events

Photos

Files

Notifications

+ Create Group


[Write Post](#)
[Add Photo / Video](#)
[Ask Question](#)
[Add File](#)

س: اي الحل .....جزاكم الله خيرا؟

**SHOURA  
CHEMICALS**

الاخ الفاضل/هذه الاصابه لها احد احتمالين اما ان تكون اصابه بالتريس او انها نقص عنصر البورون عليك بتحديد السبب وارساله لنا حتى ننصح بالعلاج المناسب

Write something...

Reda Tawfik



Mena Adel




س: الطماطم ابتدات تبشر واي طماطميه تبدا تحمرها يحصل ف المشكله المعروضه؟

**SHOURA  
CHEMICALS**

الاخ الفاضل/هذه اصابه بذوده ثمار الطماطم ويمكن استخدام اوشين بمعدل ٣٥.-٣٠ جم/فدان-رادينت بمعدل ٧٥-٧٠..اسم/فدان

Hamada Farag



س:عندى اعفان جزور ف البطاطس عمرها ٤ يوم

**SHOURA  
CHEMICALS**

الاخ الفاضل/يمكن استخدام مون كت بمعدل ٥ جم/لتر ماء- حقنا مع ماء الري

السلام عليكم كنت اريد الاستفسار عن مبيد يقضى على الذبابه في الموالح والمن ايضا وما هو انساب ميعاد لرش زيت الصيفي؟

Mohamad Ali El Dahrwy



الاخ الفاضل/للقضاء على الذبابه يمكن استخدام احد المركبات التاليه-بروفكتيون بمعدل ٧٥ سم(بروفكتيون)+٥ اسم ماده جاذبه/٢٠ لتر ماء-اكتيلك بمعدل ١٥ اسم//التر ماء-رادينت ١٥ سم//التر ماء-تك بمعدل ٥ اسم//التر ماء لعلاج الذبابه والمن-الزيوت الصيفيه او الزيوت المعدنيه يفضل استخدامها في درجه حراره لا تزيد عن ٣٠-٣١ م-لابد من رج العبوه جيدا قبل الاستخدام-الرش يكون على هيئة شمسيه -الرش والتربه بها نسبة كافيه من الرطوبه-الرش دائم في الصباح الباكر بعد تطاير الندى-عدم الرش وقت هبوب الرياح او توقيع سقوط امطار

صفحة شوري على الفيسبوك مليئة بالأحاديث الشيقة في مجال الزراعة، الآفات، والمحاصيل المختلفة. وكل شهر نستعرض أبرز الأسئلة من رفقاء شوري من المزارعين المحترفين والإجابة عليها.

"Shoura Group" <https://www.facebook.com/groups/148346308694244>

للتواصل مع المجتمع الزراعي المصري  
اشترك على صفحة شوري على الفيسبوك



BROND  
25% WG

بروند  
٢٥٪ جيبيات  
قابلة للانتشار في الماء

التعريف:

مبيد برون드 ٢٥٪ من مبيدات الحشائش القلائل التي لها تأثير اختياري لمكافحة حشيشة السعد التي تعتبر اخطر حشيشة على مستوى العالم في بعض المحاصيل الحقلية والخضرو خاصه الذرة الشامية والبطاطس. بالإضافة الى ذلك مكافحة عدد كبير من الحشائش عريضة الاوراق المقاومة لمجموعة التريازين وكذلك بعض الحشائش رفيعة الاوراق.

توصيات وزارة الزراعة المصرية:

يستعمل المبيد في محصول البطاطس عند ظهور ٣-٤ ورقات حقيقية للبطاطس لمكافحة حشيشة السعد (الاصفر- الأرجوان) وذلك بمعدل ٢٥ جم /لفدان

فتره ما قبل الحصاد:

في البطاطس ٦٠ يوماً بعد المعاملة بالمبيد

مميزات بروند

مكافحة وثبيط نمو حشيشة السعد في محصولي البطاطس والذرة الشامية حيث تعتبر هي الحشيشة الاولى على مستوى العالم من حيث خطورتها وصعوبة مكافحتها.

شوكى  
ل溉يات

دليل  
رفيق  
المزارع

١٦٥٥٨